



# LUFTY

## simeticona



### FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Cápsulas gelatinosas moles 125 mg.

Embalagem com 75 cápsulas moles.

\* \*Embalagem múltipla.

### USO ORAL

### USO ADULTO

### COMPOSIÇÃO:

Cada cápsula gelatinosa mole contém:

simeticona ..... 125 mg

Excipientes q.s.p. .... 1 cápsula gelatinosa mole

Excipientes: essência de menta, gelatina, sorbitol, corante verde nº 3, corante vermelho nº 33 e água purificada.

### PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

LUFTY® é indicado no alívio dos sintomas relacionados ao excesso de gases no aparelho digestivo, que geram flatulência, desconforto abdominal, aumento de volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen. Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia.

### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Na distensão abdominal grave, cólica grave, dor persistente (mais que 36 horas), massa palpável na região do abdômen, alergia a simeticona e a

seus derivados, perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida.

### O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não ultrapassar a dose máxima indicada, a menos que sob orientação médica.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

### ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O LUFTY® cápsula gelatinosa mole deve ser conservado à temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### Características físicas

Cápsula gelatinosa mole, de forma oval e cor roxa.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso ele esteja no prazo de validade e você observar alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**





## **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**USO ORAL. USO ADULTO.** Tomar uma unidade do medicamento. Se necessário, repetir essa dose com intervalo de 6 horas. Não ultrapassar a dose de 4 unidades ao dia. Uso para Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia: modo de uso conforme indicação médica.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvida este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico.**

**A cápsula gelatinosa mole não deve ser partida, aberta ou mastigada.**

## **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso haja esquecimento da ingestão de uma ou mais doses deste medicamento, a posologia indicada deverá ser retomada, não havendo necessidade de repor as doses esquecidas.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.**

## **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Pode ocorrer diarreia, náuseas, regurgitação e vômitos.

## **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Experiência de superdose após a comercialização é limitada, sendo registrada com ou sem sintomas. Sintomas podem incluir diarreia e dor abdominal.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº 576/2021.**

Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters  
- CRF/SC 4116

## **AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICALTDA**

Rodovia SC 390, km 459, nº 500

Bairro: Ilhota/Distrito Industrial

Pedras Grandes/Santa Catarina - CEP 88720-000

CNPJ: 01.858.973/0001-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA



**SIA** Serviço de  
Informação  
Airela  
**0800 646 2010**  
[www.airela.com.br](http://www.airela.com.br)

