



LUFTY EMULSÃO ORAL

simeticona



FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Emulsão oral 75mg/mL. Frasco de 30 mL.

USO ORAL.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada mL (15 gotas) da emulsão oral contém:

simeticona 75 mg

Excipientes q.s.p. 1 mL

Excipientes: propilenoglicol, goma xantana, metilparabeno, propilparabeno, ciclamato de sódio, sacarina sódica, aroma de cereja, corante vermelho nº 40, ácido cítrico, óleo de ricino hidrogenado etoxilado e água purificada.

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

LUFTY é indicado para o alívio dos sintomas relacionados ao excesso de gases no aparelho digestivo, que geram flatulência, desconforto abdominal, aumento de volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen. Preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não deve utilizar **LUFTY** se tiver alergia ou sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Não use **LUFTY** se você apresentar algum dos seguintes sintomas:

Distensão abdominal grave (grande aumento do volume abdominal); cólica grave (dor na barriga de forte a intensa); dor persistente (mais que 36 horas); massa palpável na região do abdômen e perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não ultrapassar a dose máxima indicada, a menos que sob orientação médica.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

LUFTY deve ser conservado à temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C), Após aberto, válido por 6 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso ele esteja no prazo de validade e você observar alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.





COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Cada 1 mL = 15 gotas (quando o frasco for mantido na posição vertical).

Crianças com até 2 anos: tomar 3 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 36 gotas/dia.

Crianças de 2 a 12 anos: tomar de 3 a 6 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 36 gotas/dia.

Adultos: tomar 8 a 25 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 100 gotas/dia.

Uso para preparo do paciente a ser submetido a endoscopia digestiva e/ou colonoscopia: modo de uso conforme indicação médica.

AGITE ANTES DE USAR.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvida este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico.

A cápsula gelatinosa mole não deve ser partida, aberta ou mastigada.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma ou mais doses deste medicamento, a posologia indicada deverá ser retomada, não havendo necessidade de repor as doses esquecidas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Pode ocorrer diarreia, náuseas, regurgitação e vômitos.

MEDICAMENTO NOTIFICADO, conforme RDC nº 576/2021.

Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters – CRF/SC 4116

AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Rodovia SC 390, km 459, nº 500 – Bairro: Ilhota/Distrito Industrial

Pedras Grandes/Santa Catarina – CEP 88720-000

CNPJ: 01.858.973/0001-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA

sia@airela.com.br



PAPEL RECICLÁVEL

SIA Serviço de
Informação
Airela
0800 646 2010
www.airela.com.br

airela
PHARMACÊUTICA

