



# Abidor® Criança



paracetamol

## FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Forma farmacêutica: suspensão oral  
Concentração do princípio ativo: 32 mg/mL

Cartucho contendo frasco plástico com 60 mL + copo dosador.

## USO ORAL USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### Composição:

Cada mL da suspensão oral contém:

paracetamol.....32 mg

Excipientes q.s.p.....1 mL

Excipientes: ácido cítrico, benzoato de sódio, glicerol, celulose microcristalina + carmelose, sacarina sódica, aroma de salada de frutas, aroma de morango, vermelho ponceau, sorbitol, goma xantana, hidróxido de sódio e água purificada.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### INDICAÇÕES

Uso adulto.

Indicado para redução da febre e o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual.

Uso pediátrico.

Indicado para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual.

### MODO DE USAR

USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Uso Adulto.

O paracetamol pode ser administrado independentemente das refeições. A dose diária total de paracetamol não deve exceder tanto a dose de 75mg/kg (correspondente à 2,3 mL por Kg) quanto 4000mg (correspondente à 125 mL) no período de 24 horas.

Uso pediátrico (Abaixo de 12 anos)

A dose recomendada de paracetamol varia de 10 a 15 mg/kg/dose (correspondente a 0,3 a 0,4 mL por Kg por dose), com intervalos de 4 a 6 horas entre cada administração. Não exceda 5 administrações de aproximadamente 50 - 75mg/kg (correspondente a 1,5 a 2,3 mL por Kg), em um período de 24 horas.

Uso pediátrico (Abaixo de 2 anos/11 kg)

Consulte o médico antes do uso.





Peso (Kg)	Dose (mL)
11 - 15	5
16 - 21	7,5
22 - 26	10
27 - 31	12,5
32 - 43	15
Para crianças abaixo de 11Kg ou 2 anos, consulte seu médico	

## MODO DE USAR

Agite bem o frasco. Abra o frasco desenroscando e fazendo leve pressão para baixo na tampa. Adicione a quantidade (mL) desejada no copo dosador. Feche o frasco enroscando e fazendo leve pressão para baixo na tampa. Lave bem o copo dosador após o uso.

## ADVERTÊNCIAS

A dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada. **NÃO** administrar este medicamento diretamente na boca do paciente. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não use com outro produto que contenha paracetamol. Este medicamento contém paracetamol. Pacientes adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda no caso de ingestão de mais de 4g de paracetamol em 24 horas, uso concomitante de outros medicamentos contendo paracetamol ou ingestão de 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o

tratamento. Consulte seu médico antes de usar o medicamento se você já possui problemas no fígado. Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento se você está tomando varfarina ou outros derivados cumarínicos. **OBS. O PRODUTO SÓ PODE SER VENDIDO EM EMBALAGEM “À PROVA DE CRIANÇAS”.**

## CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 a 30 °C). Após aberto, válido por 12 meses.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

**AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº 576/2021.**

**Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters - CRF/SC 4116**

**AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA**

Rodovia SC 390, Km 459, nº 500,  
Bairro Ilhota, Distrito Industrial  
CEP: 88720-000, Pedras Grandes, SC  
C.N.P.J.: 01.858.973/0001-29



PAPEL RECICLÁVEL

**SIA** Serviço de  
Informação  
Airela  
**0800 646 2010**  
[www.airela.com.br](http://www.airela.com.br)

**airela**  
PHARMACEUTICA

