



HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO AIRELA®



hidróxido de alumínio

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Forma farmacêutica: suspensão oral

Concentração do princípio ativo: 60 mg/mL

Apresentações:

Caixa contendo 50 frascos plásticos opacos com 100 mL cada

Caixa contendo 50 frascos plásticos opacos com 150 mL cada

USO ORAL

USO ADULTO

Composição:

Cada mL da suspensão oral contém:

hidróxido de alumínio 60 mg

Excipientes q.s.p 1 mL

Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, propilenoglicol, sacarina sódica, simeticona, goma xantana, aroma de menta e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

INDICAÇÕES

Antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.





MODO DE USAR

Uso interno. Tomar de 5 a 10 mL, quatro vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições, e antes de deitar, ou a critério médico.

Agite antes de usar.

CONTRAINDICAÇÕES

Agitar antes de usar. Obstipante (causa constipação, prisão de ventre).

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 a 30 °C). Após aberto, válido por 6 meses.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006. AFE Nº 1.04493-8

Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters - CRF/SC 4116

AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Rodovia SC 390, Km 459, nº 500 Bairro: Ilhota, Distrito Industrial

CEP: 88720-000, Pedras Grandes, SC

C.N.P.J.: 01.858.973/0001-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA



PAPEL RECICLÁVEL

SIA Serviço de
Informação
Airela
0800 646 2010
www.airela.com.br

airela
PHARMACÉUTICA

