



# RESFENAX<sup>®</sup> UNO



## FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

Forma farmacêutica: Comprimido

Concentração do princípio ativo: 750 mg

Cartucho contendo 2 blisters com 10 comprimidos cada.

## USO ORAL

## USO ADULTO

### Composição:

Cada comprimido de 750 mg contém:

Paracetamol DC90\* .....750 mg (equivalente a 833,33 mg de paracetamol DC 90%)

Excipientes q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: povidona.

\*povidona, amido, amido pré-gelatinizado, amidoglicolato de sódio, ácido esteárico, etilparabeno, propoilparabeno.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

## INDICAÇÕES

Indicado para redução da febre e o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual.

## POSOLOGIA

USO ORAL. USO ADULTO

Utilizar 1 comprimido (750 mg) no intervalo de 4 a 6 horas, não excedendo a quantidade de 5 comprimidos em um período de 24 horas.

Os comprimidos devem ser administrados por via oral, com líquido. Uso adulto (acima de 12 anos). **ATENÇÃO:** A dose diária total recomendada de paracetamol é de 4000 mg administrados em doses fracionadas, não excedendo 1000 mg/dose em intervalos de 4 a 6 horas, em um período de 24 horas. A duração do tratamento depende da remissão dos sintomas.





## ADVERTÊNCIAS

A dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada. Não use com outro produto que contenha paracetamol. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Este medicamento contém paracetamol. Pacientes adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda no caso de ingestão de mais de 4g de paracetamol em 24 horas, uso concomitante de outros medicamentos contendo paracetamol ou ingestão de 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento. Consulte seu médico antes de usar o medicamento se você já possui problemas no fígado. Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento se você está tomando varfarina ou outros derivados cumarínicos.

## NÃO USE OUTRO PRODUTO QUE CONTENHA PARACETAMOL.

## CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 a 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

**AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.  
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

**MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº 576/2021.**

Farmacêutico Responsável: Rodrigo Rebelo Peters - CRF/SC 4116

### AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Rodovia SC 390, Km 459, nº 500 Bairro Ilhota, Distrito Industrial

CEP: 88720-000, Pedras Grandes, SC

C.N.P.J.: 01.858.973/0001-29

INDÚSTRIA BRASILEIRA



PAPEL RECICLÁVEL

**SIA** Serviço de  
Informação  
Airela  
**0800 646 2010**  
[www.airela.com.br](http://www.airela.com.br)

**airela**  
PHARMACEUTICA

